

249  
—  
5

35355/p

---

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

FEBRE FLAVA INDIAE  
OCCIDENTALIS.

---



FRATRI OPTIMO SUO

FOSTER MARCH,

ARMIGERO,

AD

SM. IAGO DE LA VEGA,

IN

JAMAICA

HABITANTI,

PROPTER BENEFICIA INNUMERA,

AMORE VERE FRATERNO,

IN EUM COLLATA,

HAS STUDIORUM PRIMITIAS

ANIMO GRATÅ

OFFERT

AUCTOR.

Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

NEC NON

GUALTERO LUNDIE,

ARMIGERO,

IN

JAMAICA,

CHIRURGO,

ET

ANDREÆ WARDROP, M. D.

IN URBE EDINENSI,

CHIRURGO PERITISSIMO,

SUB QUORUM AUSPICIIS

ARTEM MEDICAM EXPLORAVIT,

HANC DISSERTATIONEM INAUGURALEM

OBSERVANTIA ET EXISTIMATIONE SUMMA,

DICAT ATQUE CONSECRAT,

GULIELMUS MARCH.

Mr. Moore

with best Compliments

from the Author



DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

FEBRE FLAVA

*INDIAE OCCIDENTALIS.*

---

**H**UNC è catalogo morborum longo mihi  
felegi, ut dissertationis inauguralis argu-  
mentum esset, brevi, ut spero, in illâ orbis regi-  
one, artem medicam exerciturus, ubi diu, nec  
hodie mitior, cladem miserrimam hominibus in-  
tulit.

A

Nomine

Nomine febris flavae apud nos vulgo appellatur, a flavedine, in exemplis plerisque, super cutem diffusâ, morbo ad finem vergente. Apud gentes alias; varie audit, ob res diversas quibus distinguitur. Hispani, *vomito preto* vocant, à signo quodam ejus dirissimo, quippe haec vocabula vomitum nigrum denotant. Gallis, sub nominibus *Fievre de Matelot*, et *la Maladie de Siam*, innotuit; illo, quia nautas saepius adoritur et necat; hoc, ab opinione falsâ, quod morbus ab regno isto acceptus fuerit, et in India Occidentali propagatus.

Ex LIND et HILLARY sententiis, hic morbus, Insularum Occidentalium nostrarum indigena habetur. Advenas ferè solos corripit, eos praesertim, qui à regione frigidâ vel temperatâ advecti fuerint; et ex his, prae aliis, milites et nautas. Feminae et infantes ei minus obnoxiae quam ii jam memorati inveniuntur; at ex omni genere robustissimi



buftiffimi et temperamento fanguineo praediti maximè tenentur periculo. Nigros ab hoc malo Natura benigna omnino liberaffe videtur.

Haud pro comperto apparet, tempeftatis conditionem aut anni tempora magis minùsve hunc morbum afficere, nifi, quod in omni febre plerumque accidit, figna, in calida quam in temperata graviora fieri.

Postquam caelo et aeri inclementi harum regionum aliquis fe temerè expofuerit, aut intemperantiae imprudenti indulferit, languorem et debilitatem infignem, dolore capitis et vertigine, primo, conqueritur. Vertigini fuccedunt naufea, frigus, horror, rarò cum rigore, anxietas et fenfus quidam ardens circa praecordia et capitis regionem. Nullo diei tempore certo invadit. Corporis calor mox augetur; dorfum dolet, fed caput, acerbiffimè. Mufculi crurum quoque dolore

lore interdum tentantur. Facies rubore suffunditur; oculi rubent, et calore ardente inflammati aliquantulum prominent. Vultus tristiciâ et squalore fero horret.

Pulsus admodum variant; in quibusdam celeres, duri, debiles, nec non interdum pleni. In aliis citati sunt, aliter naturales. Respiratio, plena, cita, laboriosa est. Cutis calida est, interdum arida, saepius humida. Calor, licet non admodum intensus digito pertractantis sensum peculiarem addit.

Lingua interdum sicca est et siti inexplebili afficitur, sed longè frequentius madet, mediâ parte impura, extremis rubra, unâ cum oris sapore amariuscule, et siti haud ita magnâ.

Urina variat; in quibusdam parca, turbida, et rufa, ardorem in urethrâ quandam eiens, dum mittitur.

Pleraque

Pleraque ex his signis augeri pergunt, et multò graviores fiunt. Nausea et vomitus propè semper vexant; calor et hypochondrii dextri dolor acerbior, et pressurà graviores accrescunt: Oppressio dira praecordia obsidet, suspirio frequenti et profundo, inquiete ingenti et artuum jactatione perpetuâ. Nulla positio requiem conciliare potest; somnus propè nullus est, vel adeò perturbatus, ut nihil corpus reficiat. Ventriculi dolor violentus premit, qui adeo irritabilis est, ut quicquid ore accipiatur ferre recuset. Dolor capitis intolerabilis fit, sensu admodum misero qui frontis regionem occupat.

Oculi rubri et dolentes manent, lucis intolerantiâ; vultus quoque torvus atrocitate quadam haud exprimi facili tenetur.

Haec signa in diem tertiam plerumque perstant, licet interdum non ultra primam vel secundam,  
in



in quibusdam usque in quartam, cum pulsus multum cessat, et intermittit, quamvis est ubi citatus maneat. In quibusdam haud citatior quam in bonâ valetudine invenitur, sed hoc animadvertendum est, quod semper debilis sit, et sudores gelidi viscosi comitentur.

Lingua, crustâ quâdam fuscâ, interdum nigricante tum operitur. Materia vomitione rejecta, quondam subviridis, nunc obscura, fusca, interdum striis oleum referentibus, nigrior fit. In hoc stadio morbi nulla vomendi cupido est, donec plurimum materiae in ventriculo collectum sit, cum subitò, et magna profusione ejicitur. Aeger tum quietus manet, donec onus aliud in stomacho congeratur, quod, ut antea, projicit.

Coma quod delirium aliquando dirumpit, nunc demum, supervenit. Delirium interdum saevit, et aeger furiosus fit; sed hoc porrò accidit, brevi post  
initium

initium morbi, et complurium viribus saepissimè eget, qui aegrum in lecto retineant. Cum hoc adveniat oculorum pupillae, morbo jam incipiente, dilatantur.]

Sitis quae in quibusdam haud magna, in aliis ingens est. Sedes nigriusculae, picem referentes, frequentius jam dejiciuntur, et faectorem intolerabilem emittunt. Urina quoque subnigrescit, crassa, acris, sanguine rubro commixta, guttatim exprimitur.

Oculorum rubor, qui olim subnigrescere incepit, nunc in flavedinem mutatur. Haec flavedo circum os, oculos, per tempora, collum, et praecordia primum observatur, nec ita multò post, per totum corpus spargitur. Et hanc signa dirissima et suprema comitantur; singultus nempe, coma profundum, oculus nubilofus, pupillâ manifestè dilatata; pulsus serpens et intermittens; petechiae



petechiae per corporis partes aliquas, abdomen et femora praesertim; haemorrhagiae a locis diversis prorumpentes, ut a naribus, ore, auribus, oculisque; aliquando è cutis spiraculis; respiratio laboriosa et interrupta; subsultus tendinum, suspiria multa, anxietasque magna; extremitatum frigus et postea totius corporis, vocis haesitatio; tremores, postremo convulsiones, quae mala omnia finiunt.

Sed minimè infrequenter accidit, ut momenta suprema aeger tranquillius attingat.

Pulsus rapidè decedit, visus et auditus obstruuntur, oculi sine motu stant, et somno aeterno premitur.

Interdum autem evenit, ut circiter horam duodecimam ab accessione morbi, signorum remissio levis, minime tamen vera fiat. Nihil enim  
huic

huic fidendum est; brevi, signa recurrent, et viâ jam memoratâ finient. Tertiam quoque circiter diem, pleraque ex signis interdum remittunt, et alia multum diversa, ut fudor et diarrhoea lenis superveniunt, prioribus omnino evanescentibus. Sed exitus felix non expectandus est; licet enim calor naturalis factus fuerit, dolor capitis cessaverit, et aeger a signis omnibus liberum se senserit, eatenus quidem ut ipse et circumstantes periculum jam amotum credant, attoniti se spem inanem fovisse invenient; nam brevi, dum falsa niteant, convulsiones et mors atra aderint. Sin autem, in hoc stadio, intermissio adveniat fudoribus lenibus ab toto corpore provenientius, pulsus naturalis et rite fortis redeat, morbus vincitur, cura peracta est—sed haec rarò nec temerè occurrunt.

Cadaver paullulò post mortem putrescit, tam brevi quidem ut non ultra horam septimam vel

B

octavam

octavam deinceps inhumatum fervare liceat. Cutis purpurea vel nigra fit, maxime circa praecordia, hypochondriumque dextrum, et sanguis à variis meatibus exudat.

Duratio hujus morbi variat; in exemplis quibusdam saevissimis intra horam vigesimam quartam, aegrum conficit; in aliis mitioribus in diem septimam, novam aut undecimam profertur. Tempus ejus ordinarium quatuor aut quinque dies complectitur. Sanguis ab iis qui venaesecutionem suaferunt, colore admodum vivido et rubro esse fertur, multum rarefactus, sine ullo visciditatis signo; et cum frigidus sit, crassamentum vix cohaerere, sed fluctuare affirmant. Sanguis, die secundâ missus, multò magis dissolvitur, serum flavius est, crassamentum vividum, et colorem diei prioris retinens, nisi quod maculis paucis nigriusculis superficies ejus tingatur.



Cerebri venae sanguine nigro turgidae inventae fuerunt ; in exemplis quibusdam feri effusio in ventriculis detecta est. Omnia fere viscera in statu morbido, cadaveribus sectis, reperta fuere. Pulmones lividi, aliquoties maculosi. Ventriculus et canalis intestinorum partes summae colorem nigro-flavam et inflammationis praegressae notas habuerunt : ventriculi tunica villosa nec non duodeni in locis quibusdam abrasa est. Et haec et jecur maculis nigris, lividis et corruptis completa sunt. Vesica felle ferè semper turgida est, materiam nigram crassam, picem liquidam multum referentem habens. Haec quoque in duodeno inventa sunt et canalis partibus ei contiguus. Facies interna vesicae urinariae sanguine grumoso completa fuit.

## DIAGNOSIS.

## D I A G N O S I S.

MORBI, quibus hic similior est, sunt *Febris biliosa remittens*, et *Typhus regionum calidarum*: à primâ, signorum violentiâ, et cursu in dissolutionem rapido distinguitur; porro haec febris nullam remissionem manifestam patitur, sed ab initio sine cessatione alternanti ad finem progreditur, postremò, dilatatione pupillae et suspirio frequenti ab imo pectore ducto.

Dolor capitis singularis et perpetuus huic morbo proprius esse dicitur. Ii quoque laborantibus hac febre famulari assuefacti, oculorum et vultus speciem singularem memorant, quâ hanc ab omnibus aliis certissimè distinguant. Haec autem oculorum et vultus species à nemine verbis satis expressa fuit.

Ab altero morbo discrepat, quia non contagiosa



osa fit, et indicia, signa multo majora inflammationis, sub initio et primo gradu, praeferunt. Haec autem discrimina minimè certa sunt, quippe verisimile est, ea interdum confundi. Ad febres distinguendi in regionibus calidis, difficultatem illustrandam, verba LIND, citare libet, ubi haec ait. “ \* It is to be observed, that when a  
“ person, upon his first arrival in the West In-  
“ dies, or in any other country between the  
“ tropics, is attacked with a fever, no physician  
“ can tell what symptoms will occur in its pro-  
“ gress, or whether it will terminate by dis-  
“ charges of bile, by a jaundice, or by symptoms  
“ of a malignant nature.”

## RATIO SIGNORUM.

DOLOR capitis intensus et oculorum rubor, ex vasorum cerebri distentione praeter naturam ab impetu sanguinis in caput aucto oriuntur.

Oppressio

---

\* Essay on Diseases of Warm Climates, p. 232.

Oppressio et anxietas circa praecordia ex irritatione in ventriculo factâ ab secretione bilis auctâ et vitiatâ ortum ducunt, quae irritatio sanguinis decursum in eum locum efficere possit.

Vomitio frequens ab irritatione bilis acris et vitiatae in stomacho et duodeno excitatâ, vel secretione succi gastrici prava gignatur; vel denique symptomatrica fit ex capitis affectione, consensus enim intimus inter haec organa primaria semper subsistit. Vomitus niger, bilis est corrupta, in statu quodam singulari, interdum sanguine ab ventriculi vasibus, forsan etiam hepatis, mixta.

Alvi astrictio, aut ab ingestis semper è ventriculo rejectis simul atque sumtae fuerint, ita ut nihil descendat; vel à motu depravato quodam canalis intestinorum ex vomitione violentâ et perpetuâ, inducto; vel ab conditione torpidâ nervorum in via alimentariâ, sensorii status quosdam semper comitante, derivari veniat.

Cutis flavedinem bilis absorptio copiâ inusitatâ secretae, et primum in massam sanguinis generalem, deinde per totam superficiem illatae, efficit.

### CAUSAE PRAEDISPONENTES.

Cum pro certo notum sit, eos temperamento sanguineo et corpore robusto, maxime autem eos à plagâ orbis frigidâ advectos, huic morbo prae aliis obnoxios esse, aliqua conditio in corpore ipso sit oportet, quae illud malo aptius reddat; et cum appareat, exercitio violento, ebrietati vel cuivis alii quod cordis arteriarumque actionem maxime adaugeat, febrem flavam frequentius supervenire, habitum corporis plethoricum huic maximè praedisponentem crediderim.

CAUSÆ



## CAUSÆ OCCASIONALIS.

DE hac inter Medicos minime convenit. Multi qui in regionibus calidis, diu, et cum summa laude rem medicam exercuerunt, febrem hanc contagiosam esse affirmant, quod alii, nec fide minori digni è contra negant.

Rebus ita se habentibus multum dubitans ad hanc argumenti partem venio. Omnibus de hac re, quae aut legi aut audivi, ritè perpensis, eò adducor ut sententiam utramque aliquo modo veritate suffultam esse credam, nisi quod hunc morbum cum Typho Regionum calidarum confuderint; et ideo contagiosum putarint. Nullo alio modo sententiarum litem quoad hujus morbi curationem diversam componere possum quae diu bello litterato inter Medicos peritissimos quos patria

tria

tria habuit, exagitata est. Altera enim factio mortem certissimam aegro pronunciavit, si venae-sectioni decursus fuerit, altera, pari obstinentiâ, aegri vitam à Medici manibus requaesiverunt, si missio sanguinis non facta esset.

CHISHOLM differentiam esse fatetur inter eam febrem quam ille malignam et pestilentem appellat, et illam quae in Insulis Indicis Occidentalibus vulgo Flava audit, ut ex sequentibus apparet. “ \* During the insurrection, a similar dis-  
 “ tinction was perceived to take place at Gren-  
 “ ville Bay ; for, the troops, occupying that post,  
 “ at different times being exposed, under the  
 “ most unfavourable circumstances, to the mias-  
 “ mata of the extensive marshes which nearly  
 “ enclose that unhealthy place, were seized with  
 “ the diseases which are their peculiar production,  
 “ and chiefly by the yellow remittent fever ; and  
 “ a great many suffered by it. It is singular,  
 C “ however,

---

\* Essay on the Malignant Pestilential Fever, page 241.



“ however, that although no doubt can be entered  
“ tained of the diversity of the disease I have  
“ stated, a mode of treatment, almost in every  
“ respect the same, was found necessary in both.”

Magis magisque in hac sententiâ confirmor morbum de quo agitur à contagio non oriri, ab hac rê, scilicet quòd feminae et infantes haud tam promptae ab illo corripiantur, quam ii qui regionis tropicae ardoribus objiciuntur, aut vino et epulis inter amicos dediti, convivium agunt. Hae res conjunctae morbum inducere nunquam cessant; et minimum quidem exercitium sub solis superpendentis rabie fatis est ad eum excitandum. Exempla quaedam hujus vidi; unum primipili cujusdam in castris locum honestum tenentis, qui vini et brandy cerasis conditi usu non ita modico sibi indulgit. Aliquamdiu morbo caruit, ergo quia se jam regioni factum credidit, medio die, aves dejectum ire non dubitavit. Imprudentiae autem poenas graves tulit, febre enim correptus mortem oppetiit. Exempla duo alia vidi, ubi

nec

nec unus nec alter vini vel liquorum spirituosorum  
ufui immodico deditus erat, fed utrique tempus  
breve tantum in Infula commorati, febrem adve-  
narum fe effugiffe crediderunt. Sub dio igitur  
uterque in curriculo paullulum fefe expofuerat;  
et febris poft jentaculum accessit, qua mortui funt.  
Haec duo exempla conjunxi, quia fimilia erant,  
licet eodem tempore non acciderunt. In his nul-  
lum contagium investigari potuit. De aliis exem-  
plis quoque audivi procul in Mediterraneâ regione  
occurrentibus, ubi nihil contagii reperiendum erat.

Ad haec plenius confirmanda HILLARY citare  
libet, qui cum de fententiâ WARREN dicere-  
tur, morbum contaminofum effe affirmante, ita  
loquitur. “ \* But a more strict enquiry into the  
“ nature of its symptoms, and a better examina-  
“ tion of the blood of those who labour under it,  
“ would have sufficiently shewed him that it was  
“ a very different fever; to which I may add,  
“ its

---

\* Observations on the Changes of the Air, &c. pag. 145.



“ its not spreading and infecting others, as the  
“ plague always does ; for this fever very rarely  
“ or never is infectious or contagious to others,  
“ not even to those who attend the sick, except  
“ a chance time, when it is in its most putrid  
“ malignant state, in the latter end of the disease,  
“ or soon after the death of the patient, when  
“ the season is very hot; and this fever is accom-  
“ panied with the symptoms of some other ma-  
“ lignant fever, which is then epidemical and  
“ contagious.” Idem auctor ordine differere per-  
git, “ But I never could observe any one instance,  
“ where I could say that one person was affected  
“ by or received this fever from any other per-  
“ son who had it. Neither have I ever seen two  
“ people sick in this fever in the same house, at  
“ or near the same time, unless they were brought  
“ into the same house, when they had the fever  
“ upon them before they came. From whence  
“ we may conclude, that it has nothing of a pes-  
“ tilential nature in it.” Ea quae jam dixit de

naturâ

naturâ ejus pestilenti, quoad naturam ejus contagiosam aequè valebunt.

HUNTER \* porrò asseverat quòd, dum febris inter milites legionis sexagesimae quintae, saevissimè grassaretur Nigri ex quater ad octies centenos in operibus ad Montem Richmond eodem tempore occupati erant, qui milites hoc morbo laborantes in nosocomium comportârunt; nemo tamen eorum morbo tentatus est. Et quoniam medici quidam arbitrantur, licet morbus contagiosus sit, nigros homines ex quadam corporis proprietate nativâ malum effugere, verba ejusdem auctoris adducam. “ † Ea, quae postea observavi in Martinica et Santa Dominga, adhuc mihi magis confirmârunt opinionem, quam acceperam, flavam nimirum febrem haudquam pestilentem esse. Domo JOANNIS WIERII, valetudinariorum militarium, quotquot in hac  
“ insula

---

\* Vide Dissertationem Inauguralem ejus.

† Vide Dissertationem Medicam de Flava Febre, 1798.



“ infula erant, inspectioni praepositus, egometipse  
“ undecim noctes continuas in culcitam dormi-  
“ vi; inquam, duas ante noctes MACLEANIUS,  
“ secundarius valetudinarii militaris chirurgus,  
“ flava febre periverat; et nihilo tamen minus  
“ id quod non potuisset accidere, si haec pesti-  
“ lens fuisset, prosperâ, per unum postea annum,  
“ valetudine gavifus sum.”

Aeris status quidam in regionibus calidis esse potest, qui corpora Europaeorum violentius efficiat, et causis praedisponentibus adjuvatur febrem inducere valeat; tamen haud rationi magis congruit, talem febrem contagiosam fore, et eo modo propagatum iri, quam febrem intermittentem a miasmate paludum ortam, contagio postea disseminari.

Talem statum aeris existere signa hunc morbum referentia inducere valentem, ex CHISHOLM manifestum est; nec non a verbis sequentibus LIND, de aeris impuri effectibus in aegrotos in  
Jamaica



Jamaica loquentis. “ \* On that island a com-  
“ modious and excellent marine hospital was  
“ erected, for the reception of the sick seamen  
“ in his Majesty’s ships on that station; which,  
“ for its usefulness and grandeur, was called  
“ Greenwich Hospital. It was unfortunately  
“ built near a marsh, upon a most unhealthy spot  
“ of ground. The effects of this unhealthy situa-  
“ tion were, that when a patient was sent thi-  
“ ther, with only a gentle or intromitting fever,  
“ this mild indisposition was apt to be changed  
“ either into a malignant fever, a bloody flux, or  
“ some other mortal distemper.”

Morbus huic simillimus in navigatione ortus  
est, ubi non ad paludum miasmata attribui potuit,  
qui non contagiosus erat †.

## P R O G-

---

\* Essay on Diseases incidental, &c. p. 173.

† Vide Bryce opera.

## P R O G N O S I S.

PRIMUM ad corporis conditionem, tempore quo morbus apparet, animadvertendum est. Periculum ingens adest, si post expositionem longam sub solis ardoribus vel ebrietatem immodicam febris accesserit. Si in flore aetatis et plethorici sunt, tristes et salutis desperantes; si lingua morbi initio tremat; si flavedo per cutem maturius diffundatur, si cutis arida et scabra sit, et quo longius haec ita maneat, tanto pejora ominatur. Suspiria crebra et profunda, sanguinis è naribus et aliis locis corporis profusio, et maculae lividae fatum portendunt. Si vomitio perpetuò ingruat, et quod ejicitur nigrum fiat, haec summam debilitatem indicant. Si coma accedat, brevi post initium, vel delirium una cum oculis admodum inflammatis, hoc excipiat, nec  
non

non evacuationum, sedium et urinae cessatione comitante haec signa valdè infauſta ſunt.

E contra autem ſpes exitûs felicioris fovère licet, ſi ſigna jam memorata abſint; cum dolores et vomitiones recedant, fitis non valde premat, flavedo non ante diem ſeptimam appareat, vel donec coma et alia ſigna pejora evaneſcere caeperint; cum evacuationes ſedium et urinae non multum a ſtatu naturali mutantur; aut ſi diarrhoea ſuperveniât, quae non aegrum debilitat, ſed oppreſſionem et anxietatem levât; ſi ſudor lenis, calidus, et naturalis prorumpat; et aliqua alimenti cupido oriatur. Si narium hemorrhagia initio morbi eveniat, interdum critica eſt. BRYCE \* ait, febris levamen ab linguâ circa margines et partem extremam, puritatem accipiente, indicatum fuiſſe; et praeter omnia alia quod aeger ſomno integro et reparante frui inciperet.

D

CURATIO.

---

\* Vide Operis ejus pag. 35.



## C U R A T I O.

*Consilia Medendi tria indicantur,*

1<sup>mo</sup>, Materiam corruptam in via alimentaria expurgare, et ne postea congeratur, prohibere.

2<sup>dò</sup>, Violentiae febris moderari, et signa graviora levare.

3<sup>tio</sup>, Proclivitati in putrefactionem obviam ire, et corpori tonum et vigorem reddere.

Quod ad horum primum attinet, emeticorum usum ad materiam acrem biliosam, nimis abundantem, expurgandam, ab ratione ordinariâ medicis suggeri necesse est. Haec in ventriculo congesta signorum gravissimorum complurium ab initio morbi causa esse videtur. Sed experientia docuit, talem usum emeticorum non modò periculosum sed nocentissimum esse. Ventriculi enim tunicae stimulo jam admodum affici videntur.



tur, bilis acrimoniâ forsan inflammatae. Emeticorum lenissimorum igitur exhibitio, vel dosibus minimis, vomitionem perpetuam inducere periclitatur, inflammationem ciere pronam, quae, omnibus tollendi rationibus spretis, in gangraenam tandem definet. Sed re maturius perpensâ nullam causam perspicere possum, cur medicamina ad vomitum ciendum dare oporteat, quippe actio illa, bilis irritatione, jamjam excitata est; et nihil faciendum restat, nisi ut stomachi congesta acria dilutione copiosâ mitigentur, quod aquae haustibus magnis efficere licet, vel quod forsan potius sit, in bilem chemicè agendo, limonum praeparato, vel acidi sulphurici guttis paucis in aquâ dilutis.

Cum ventriculus his modis purgatus fuerit, ad partem alteram consilii primi accedendum est, quam ab catharticis peragere necesse erit. Sin autem ventriculus adeo excitatus persistet, ut ea retinere neget, opiatum, camphorâ commissum, prius

prius administrari debet. Hoc temporis aegrum quietum paululùm manere praestabit ut remissionem ab anxietate ejus habeat, et ventriculus tonum ejus idoneum recuperet. Properandum est utcunque ad cathartica quam primum administranda, licet fortuna non tempus ab vomitione perpetuâ liberum concedat; pars enim aliqua eorum in ventriculo retineatur, vomitione haud ejecta; et haec intestina ad munera sua fungenda excitet, vomitumque mitiget. Medicamina à quibusdam in hanc rem laudata, sales sunt neutrales, ab aliis verò cathartica antiseptica, putà manna, tamarindae et tartari crysalli.

Sed utcunque haec in exemplis mitioribus utilia inveniantur, in plerisque ea exhibere non licet. Nam quia ventriculi excitatio jam permagna est, et haec intestinorum statum torpidum plerumque inducunt, doses majores et fortiores, praeter certitudinem magis excitandi, dare postulatur, quam stomachus ferre valebit. Prosperiendum

ciendum est igitur ut medicamen aliquod inveniamus, parvâ mole et pari efficacia ; et in hoc propositum, nihil aequè respondere, ac hydrargyrus muriatus mitis, experientia docuit. Actio ejus ab jalapa, gambogio, scammonio, et similibus accelerari potest. Haec medicina in omnibus regionum calidarum febribus multis laudibus praedicatur, ut ex libello quodam in Medicinae Annalibus anno 1797, a Doctore WRIGHT conscripto, videre est \*.

Effectus porrò ejus, successu singulari stipantur, ut ex verbis sequentibus Domine BRYCE apparet, “ I have often given a brisk cathartic of this  
“ kind, when the pulse has been so feeble as  
“ scarcely to be felt ; when hemorrhage, low delirium, nervous tremors, and faintings, seemed  
“ to indicate the greatest debility ; and after several copious, viscid, and excessively putrid  
“ evacuations,

---

\* Vid pag. operis ejus 346.



“ evacuations, procured in this manner, have had  
“ the satisfaction to find that the patient very  
“ soon acquired great increase of strength ; that  
“ those threatening symptoms went off entirely ;  
“ and that by continuing these evacuations, ac-  
“ cording to circumstances, the disease was soon  
“ brought to a happy termination \*.”

Hydrargyri muriati mitis quantitas admini-  
stranda, multum ab effectibus ejus pendeat. Si  
intestina non prius diarrhoeâ afficiantur, quindecim grana, et tantundem pulveris jalapae, primae dosi attribuenda arbitror ; et hydrargyri muriati mitis quinque ad decem grana, in spatia trium aut quatuor horarum singula, deinceps, pro actione ejus in alvo movenda, administrari possunt.

Enema emolliens exhiberi debet, antequam catharticum ab aegro sumatur, ad faeces induratas,

tas, si quae sunt, ex intestinis abducendum, et actionem ejus melius promovendum.

Ad consilium secundum nunc progredior nempè ad signa gravissima amoliendum. Haec plerumque sunt dolor capitis et in regionibus epigastricis, una cum anxietate febrili magna. Hoc consilio si pulsus fortis sit, et aegrotus habitu plethorico, venaesectio, in vel ad uncias octo, forsan ea levabit. Multum autem cavendum est ne hanc temerè utamur; si in primo morbi accessu non arcessiti fuerimus. Et ne tum quidem sanguinem mittere licet, nisi omnia alia prius frustra tentata sint, ut cataplasmata, sinapismi et topica caetera.

Violentia febris mitigari potest aeris puri et frigidi liberâ admittance. Beneficia hujus manifesta sunt, ex iis quae BRYCE \* refert, nempe quod: " When unable to walk, they were carried

" ried

---

\* Vide Pag. ejusdem 80.

“ ried upon deck, and exposed to the free air  
“ with the greatest advantage; if they had been  
“ delirious or in a comatose state while below,  
“ these symptoms generally went off after having  
“ been some time on deck; the pulse became  
“ more firm; and, above all, the calomel was  
“ rendered more certain and speedy in its operation.”

Pedum et manuum aceto et aqua frigidâ lavatio saepies repetita, in cathartici actione promovendâ multum juvabit.

Quatenus frigidarii usus amplior beneficio foret haud liquidò mihi constat. Ex effectibus ejus salutiferis in patriae febris putridâ et in febris quâ Doctor WRIGHT correptus fuit, dum ex Insulis Indiae Occidentalis domum navigabat; nec non ex aliorum testimoniis, multus adducor ut credam, affusionem aquae frigidae vel aquae aceto commistae plurimum beneficii in hac quoque alaturam esse.



Sudorifica in hoc morbo non adhibere licet sine multo ventriculum magis stimulandi periculo. Isto tamen modo haustus repetitos limonum liquoris, vel fago cùm limonum succo, acidi sulphurici guttas paucas aqua dilutas, fructus acido-dulces et similia dare possumus.

Quod ad consilium tertium attinet, scilicet corpori tonum et vigorem reddere, et putrefactioni citissimè occurrere ; tanta et tam rapida in dissolutionem proclivitas in hoc morbo cernitur, ut nullum tempus haec agendi omitti debet. Cinchona adeò antiseptica, et in regionum calidarum febribus aliis tam usitata, nihil in hac prodest, quia stomachus tanta excitatione tenetur, ut dosini doneam ejus, utcunque datam, non ferre valeat. Nisi in exemplis mitissimis igitur non potest exhiberi ; multo autem beneficio in parte alterâ hujus consilij exsequendâ usurpatur, nempe in vigorem corporis restituendo, cum primum signa jam remitti animadvertantur. Radicem serpentariae sub forma infusi, HILLARY mul-

tum proficere invenit, de virtutibus cujus ita loquitur. “ Wherefore I tried it mixed with  
“ some others in the following manner, and with  
“ much better success than I could hope for, or  
“ durst expect. For I found that a light infusion  
“ of this root not only sat easily on their stomachs,  
“ but it moderately raised the pulse and  
“ fever, which were now sunk too low, and kept  
“ them in an equal moderate state if prudently  
“ given\*.”

Capfici in hujus morbi curatione usus plurimum nuper obtinuit; multo beneficio credo. Sub parva mole dari, et longe facilius quam cetera anteseptica et stimulantia in stomacho retineri potest, hydrargyro muriato miti etiam conjungitur. Ab quibusdam in Jamaicâ medicinam exercentibus, ad vomitum levandum, utile fertur; et pilula ejus circiter grana tria complectens in hunc usum conducit.

Ex

---

\* Vid. page ejus 165.

Ex omnibus antisepticiis vinum præstat quia simul alimentum præbet. Vinum Madeirense optimum in hanc rem judicaverim; et nisi admodum aegro ingratum sit, cyathus vini, horarum trium per spatia singula, stadio morbi primo, administretur, postea augendi, morbo progrediente. Ante stadium postremum vel etiam post hoc accefferit, pulsus à depressione, vini enematibus, horis ternis aut quaternis redeuntibus, prout retineantur, summa ope sustinere laborandum est. Vini in hoc morbo effectus boni in exemplo Domini HUNTER optime illustrantur. Ad finem morbi, cum etiam epistaxis supervenisset, vini haustus largus fato imminenti eum eripuisse videtur.

Diaeta levis, antiseptica, concoctu facilis, et maxime e vegetabilibus constare debet. Fructus maturi aciduli; panis hordei aut oryzae decoctiones vel infusa, succi limonum aut tamarindae conservatae, dandi sunt, quibus vini Madeirensis paullulum addatur.



addatur. Quodcunque horum usurpetur, copiâ parcâ, et frequenter, administrandum est. Variare quidem ea melius erit, ne ingrata fiant. Aquae frigidae haustus modici permittendi sunt, cùm aeger sitiat et multùm cupiat. Per totum morbum mundities summa fervanda est ; aegri vestes linteae et stragula frequenter mutandae sunt.

Ex hac febre convalescentes multùm sibi consulere debent, cum morbus non solum per se ipsum periculi plenus est, sed aliis viam aperit forsan levioribus tamen haud minus timendis. Horum praecipue sunt dysenteria et jecoris affectiones.

Victus modicus, nutriens, exhilarans capiendus est. Si modò fieri potest, aeris mutatio in rus, proderit. Si vires admodum prostratae fuerint, exercitium violentum vel corporis vel mentis aeger vitet ; gestatio tamen modica in equo vel curru, tempore

tempore matutino vel vespertino clementi, suadenda est. Si appetitus non redeat, aut concoctio mala fit, cinchonae tincturae compositae cochleare unum cum acidi sulphurici aromatici guttis paucis, in aquae vel theae florum chamaemeli frigidae calice, mane, et post meridiano ante prandium fumatur.

*F I N I S.*

---

EDINBURGI:

*CUM PRIVILEGIO,*

Apud ALEX. SMELLIE.







